

登園許可書が必要な感染症

インフルエンザ	発症後 5 日、かつ解熱後 2 日を経過するまで。	
百日咳	特有の咳が消失するまで、または 5 日間の適正な抗菌剤の治療が終了するまで。	
麻疹(はしか)	解熱後 3 日を経過するまで	
流行性耳下腺炎(おたふく)	耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発言した後 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで	
風疹(3 日はしか)	発疹が消失するまで	
水痘(みずぼうそう)	すべての発疹が痂皮化するまで	
咽頭結膜熱(プール熱)	主要症状が消失したあと、2 日を経過するまで	
結核	主治医が、感染のおそれがないと認めるまで	
髄膜炎菌性髄膜炎	主治医が、感染のおそれがないと認めるまで	
流行性角結膜炎	主治医が、感染のおそれがないと認めるまで	
急性出血性結膜炎	主治医が、感染のおそれがないと認めるまで	
腸管出血性大腸菌感染症(O-157)	主治医が、感染のおそれがないと認めるまで	
ヘルパンギーナ	発熱や咽頭・口腔内の水疱や潰瘍の急性期症状が落ち着き、全身状態が改善するまで	
溶連菌感染症	適正な抗生剤治療開始後 24 時間を経過し、全身状態が良好となるまで	
マイコプラズマ感染症	全身状態が良好となるまで	
伝染性紅斑(りんご病)	発疹以外の症状がなく全身状態が良好となるまで	
手足口病	発熱や咽頭・口腔内の水疱や潰瘍の急性期症状が落ち着き、全身状態が改善するまで	
RS ウイルス感染症	発熱や咳などの症状が落ち着き、全身状態が安定するまで	
感染性胃腸炎 (ノロウイルス・アデノウイルスなど)	下痢・嘔吐の症状が改善し、全身状態が良好となるまで	
流行性下痢症(ロタウイルス)		
頭しらみ	登園しながらの治療が可能です。	タオル・くし・帽子の共用は避けます。
伝染性軟属腫(水いぼ)		患部はガーゼなどで覆ってください。
伝染性膿痂皮(とびひ)		